



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

けっ ぶ ちく お がん
血府逐瘀丸[®]

第2類医薬品

(生薬製剤)

本剤は、中国清代に著された《医林改錯》に記載されている「血府逐瘀湯」の処方に基づくものです。中年以降または高血圧傾向の方の頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸の改善に効果があります。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感
そ の 他	異常出血

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

中年以降又は高血圧傾向のあるものの次の諸症：
頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸

■ 用法・用量

次の量を、1日3回水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	8丸	3回
15歳未満	服用しないでください。	

● 用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は15歳未満の小児に服用させないでください。

※裏面もお読みください。

■成分・分量

成人（15歳以上）1日の服用量24丸中、次の成分を含んでいます。

血府逐瘀丸料エキス末 3.0g

成分	含有量	成分	含有量
トウキ	1.98g	シャクヤク	1.32g
センキュウ	0.99g	サイコ	0.66g
ジオウ	1.98g	カンゾウ	0.66g
トウニン	2.64g	キキョウ	0.99g
コウカ	1.98g	ゴシツ	1.98g
キシツ	1.32g		

血府逐瘀湯末 1.5g

成分	含有量	成分	含有量
トウキ	0.18g	シャクヤク	0.12g
センキュウ	0.09g	サイコ	0.06g
ジオウ	0.18g	カンゾウ	0.06g
トウニン	0.24g	キキョウ	0.09g
コウカ	0.18g	ゴシツ	0.18g
キシツ	0.12g		

添加物として、トウモロコシデンプン、タルク、カルナウバロウを含有します。

●成分に関連する注意

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発売元 **イスクラ産業株式会社**
東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元 **ハツ目製薬株式会社**
〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-14-14