

ご使用に際して、この説明書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存してください。



錠剤 <sup>かっ</sup>葛 <sup>こん</sup>根 <sup>とう</sup>湯

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4)胃腸の弱い人。
- (5)発汗傾向の著しい人。
- (6)高齢者。
- (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8)次の症状のある人。

排尿困難

(9)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〔用法・用量〕

食前1時間、温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～5錠	3回

〔成分・分量〕（本剤100錠中）

日局	ケイヒ末	3.0 g	別紙規格	カッコン末	8.0 g
日局	シャクヤク末	3.0 g	局外生規	マオウ末	4.0 g
日局	カンゾウ末	2.0 g	別紙規格	タイソウ末	4.0 g
日局	ショウキョウ末	1.0 g			

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守ってください。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2  
電話：03-3281-3363  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで  
（土、日、祝日を除く）

発売元 **イスクラ産業株式会社**  
東京都中央区日本橋1-14-2  
製造元 **一元製薬株式会社**  
販売元 東京都豊島区要町3-4-10