



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

イ ス ク ラ そ う り ょ う さ ん じ ょ う がん

イスクラ双料参茸丸

第2類医薬品

(生薬製剤)

■特徴

「イスクラ双料参茸丸」には鹿茸や人参など動物・植物計 14 種類の生薬が配合されており、これらの原料を粉末にし丸剤とし、プラスチック製の容器に入れ密封したものです。虚弱体質、肉体疲労、病後の体力低下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症の改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 体を冷やすす冷たい飲み物、生もの(生野菜、生魚等)は薬効を妨げますので、なるべくさけてください。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

次の場合の滋養強壮
虚弱体質、肉体疲労、病後の体力低下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

■用法・用量

次の量を、1日2回、朝夕服用してください。


年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1丸	2回
15歳未満	服用しないでください。	

●用法・用量に関連する注意


- 服用の際、密封したプラスチック製の容器を割り、包みを除き、丸剤を取り出して、分割し服用してください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 本剤は、15歳未満の小児には服用させないでください。

※裏面もお読みください。


●服用法




1. 中央の分割線を、親指と人さし指で押さえ、外装の白蠟とプラスチック製の容器を割ります。
※品名印章を真上にした場合、水平方向が分割線となります。



2. 蠟封したプラスチック製の容器から丸剤を取り出します。



3. 丸剤を包んでいる包みをはがします。



4. 丸剤を、分割して服用してください。

◎蠟封した容器が割れにくい場合は、机など清潔な硬い平らな場所に、分割線が垂直になるように置き、手のひらで押し付けると割れます。

■成分・分量

本品 1 日量 2 丸 (20.4g) 中、下記成分及び分量を含有します。

オウギ …………… 1.13 g	ジオウ …………… 0.56 g	トウジン ……… 1.13 g	ゴウカイ ……… 0.34 g
ニンジン ……… 1.13 g	サンヤク ……… 0.23 g	ロクジョウ …… 1.13 g	トウチュウカソウ… 0.34 g
ブクリョウ …… 1.13 g	ビャクジュツ …… 0.23 g	カラトウキ …… 0.94 g	
クコシ …………… 0.68 g	カンゾウ ……… 0.11 g	ハゲキテン …… 0.56 g	

※添加物としてハチミツ、ゴマ油、ミツロウを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

URL: <http://www.iskra.co.jp/>