

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第2類医薬品

さん つう らく らく がん 散 痛 楽 楽 丸

(漢方製剤)

散痛楽楽丸は、「万病回春」に記載されている「疎経活血湯」を服用しやすい丸剤にしたものですが、その原典には“疎経活血湯は遍身走痛して刺すが如く、左足痛むこと尤も甚だしきを治す。左は血に属す。昼は軽く夜重いもの。”とあります。

散痛楽楽丸は、無理な動作やくしゃみなどで突如襲われる腰痛や筋肉痛によく奏効し、特に神経痛などは、昼間より夜間から朝方にかけて痛みが激しくなるタイプに効きます。

日常生活では身体を冷やさないように気をつけ、本剤を服用する前後には冷たい飲食物の摂取を避け、また、温かいお湯で服用するなどの心がけが、痛みを和らげるのに役立ちます。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 成分・分量 本品30丸中

トウキ(当帰) ……………1000mg	ボウイ(防已) ……………750mg
ジオウ(地黄) ……………1000mg	キョウカツ(羌活) ……750mg
ソウジュツ(蒼朮) …1000mg	ボウフウ(防风) ……750mg
センキュウ(川芎) …1000mg	リュウタン(竜胆) ……750mg
トウニン(桃仁) ……1000mg	ショウキョウ(生姜) …250mg
ブクリョウ(茯苓) …1000mg	チンピ(陳皮) ……………750mg
シャクヤク(芍薬) …1250mg	ビャクシ(白芷) ……500mg
ゴシツ(牛膝) ……………750mg	カンゾウ(甘草) ……500mg
イレイセン(威霊仙) …750mg	

疎経活血湯エキス2500mgを含有する丸剤です。

添加物として安息香酸ナトリウム、アルファー化デンプン、バレイショデンプン、セラックを含有します。

■効能・効果

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：

関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

■用法・用量

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年齢	1回の服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	10丸	3回
15才未満7才以上	7丸	
7才未満	服用しないでください。	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4) 本剤は、時により丸剤と丸剤が付着して塊状となることがありますので、服用の時、ビンを軽く振るか、スプーンなどでほぐしてから用いてください。なお、薬効には変わりありませんので、安心して服用してください。
- (5) ビンの中のつめ物は、輸送中に丸剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、箱に入れて保管してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2

電話：03-3281-3363

受付時間：午前9:00から午後5:00まで

(土、日、祝日を除く)

発売元/**イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋1-14-2

出品元/**天津楽仁堂製薬廠**

中華人民共和国・天津

製造販売元/**松浦薬業株式会社**

名古屋市昭和区円上町24-21